



ANAJALSA

FUNGICIDAS

FUNKILL (Benomilo)

Ficha Técnica

USO AGRÍCOLA

FUNKILL

FUNGICIDAS

Este producto es un Fungicida agrícola / Polvo humectable

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Benomilo : Metil-1-(butilcarbamoil) bencimidazol-2-il carbamato. Equivalente a 500 g de I.A. / Kg.

Ingredientes Inertes: Dispersante, humectante y portador 50%

Formulación: Polvo humectable

ESPECTRO DE CONTROL

Cenicilla (*Erysiphechioracearum*)

MODO Y MECANISMOS DE ACCIÓN

FUNKILL es un benzimidazol sistémico de absorción radical y foliar, traslocación principalmente acrópeta y actividad fungicida por contacto preventiva y curativa, presentado en forma de polvo humectable para aplicar en aspersión foliar. Se considera altamente persistente, su vida media es hasta de 12 meses.

FUNKILL puede ser aplicado con equipos manuales y de tractor.

Cultivos

Recomendaciones de uso

Cultivo	Plaga	Dosis	Observaciones
Pepino Calabaza Melón (SL)	Cenicilla (<i>Erysiphechioracearum</i>)	400 - 500 g/ha	Iniciar las aplicaciones en forma preventiva, sobre todo si prevalecen condiciones climáticas que favorezcan la aparición y desarrollo de la enfermedad (elevada humedad relativa y alta temperatura). Utilizar la dosis alta ante una alta incidencia y severidad de la enfermedad.

Periodo de reentrada al área tratada: 12 horas después de la aplicación.

() **Intervalo de seguridad**: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. SL=Sin límite.

REGISTRO RSCO-FUNG-0303-320-002-050

PRECAUCIÓN

Categoría Toxicológica 4

MÉTODOS PARA APLICAR EL PRODUCTO

Abra la bolsa por la parte superior, teniendo cuidado de no derramar o inhalar el producto. En un recipiente pequeño haga una premezcla con la dosis recomendada de **FUNKILL**. Llene hasta la mitad el tanque del equipo de aplicación con agua limpia, agregue la premezcla lentamente, resbalándola por las paredes del tanque, posteriormente complete el llenado haciendo una pequeña agitación. Durante el llenado del tanque use un cedazo para eliminar posibles impurezas del agua y evitar taponamientos en las boquillas. Llene los recipientes del equipo de aplicación siempre a favor del viento.

INCOMPATIBILIDAD

FUNKILL es compatible con insecticidas y fertilizantes foliares autorizados, sin embargo, para asegurarse de la compatibilidad física con otros productos se recomienda hacer una premezcla en un recipiente con la dosis completa y dejarlo en reposo durante 5 minutos; si no se presenta una precipitación de los materiales se considera que dicha mezcla no tiene problemas de compatibilidad. No se debe mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.

ECOTOXICIDAD

FUNKILL es **extremadamente** tóxico para animales (peces, invertebrados acuáticos) y plantas acuáticas (algas y plantas vasculares). Este producto es **moderadamente** tóxico para abejas. No lo aplique cuando el cultivo o las malezas están en flor y cuando las abejas se encuentren libando.

TOXICIDAD



Nocivo si se inhala

TOXICOLOGÍA A LOS ANIMALES Y HUMANOS (DL50, CL50)

Estudio	Toxicidad
Oral agudo	10,000 mg/kg
Dermal agudo	10,000 mg/kg
Inhalatorio agudo	2 mg/L

IMPORTANTE: La información aquí contenida no deberá tomarse como una fuente de garantía a implícita o explícita, ni implica una responsabilidad legal, se ofrece únicamente para su consulta.