



ANAJALSA

FUNGICIDAS

Ficha Técnica

TROXI XTRA (Azoxistrobin + Ciproconazol)

USO AGRÍCOLA



TROXI XTRA

FUNGICIDAS

Es un fungicida sistémico que permite controlar las enfermedades fungosas de manera tanto preventiva como curativa.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Azoxistrobin: 18.20% Equivalente a 200 g de I.A. / L.

Ciproconazol: 7.30% Equivalente a 80 g de I.A. / L.

Ingredientes Inertes: Humectante, dispersante, estabilizante y solvente 74.50%

Formulación: Suspensión concentrada

MODO Y MECANISMOS DE ACCIÓN

TROXI XTRA® es un fungicida sistémico que permite controlar las enfermedades fungosas de manera tanto preventiva como curativa. Se absorbe gradualmente por las hojas y se moviliza tanto por el xilema (sistémico) como traslaminariamente a través de las células.

ESPECTRO DE CONTROL

Roya amarilla (*Puccinia striiformis*), **Mancha de la hoja** (*Septoria tritici*).

Cultivos

Recomendaciones de uso

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones
Trigo (35)	Roya amarilla (<i>Puccinia striiformis</i>) Mancha de la hoja (<i>Septoria tritici</i>)	0.3 - 0.5 L/ha	Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalo de 14 días; agregar a la mezcla un coadyuvante a razón de 100 mL/100 L de agua; volumen de aplicación 550 - 650 L de agua/ha.

()= Intervalo de Seguridad, días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha; SL= Sin Límite. Tiempo de reentrada a los lugares tratados, 24 h después de realizada la aplicación. Mantenga constante la dosis indicada, los intervalos de aplicación pueden variar dependiendo de la severidad de la enfermedad.

REGISTRO RSCO-MEZC-FUNG-1301G-X0025-064-25.50

PELIGRO

Categoría Toxicológica 3

MÉTODOS PARA PREPARAR EL PRODUCTO

Para abrir el envase, solo abra el frasco y utilice. Llene el tanque a la mitad de su capacidad con agua limpia. En forma separada prepare una pre-mezcla con poca agua y la dosis a emplear de **TROXI XTRA®**. Una vez que el líquido se diluya por completo, vierta esta pre-mezcla al tanque y complete con agua sin dejar de agitar.

MÉTODOS PARA APLICAR EL PRODUCTO

TROXI XTRA® puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia del tipo cono vacío).

INTERVALO ENTRE APLICACIONES _____

Realizar aplicaciones cada 7 a 10 días en hortalizas y cada 21 días en árboles frutales.

TOXICOLOGÍA A LOS ANIMALES Y HUMANOS (DL50, CL50)

Estudio	Toxicidad
Oral agudo	2000 mg/kg
Dermal agudo	2000 mg/kg
Inhalatorio agudo	2.0 mg/L

IMPORTANTE: La información aquí contenida no deberá tomarse como una fuente de garantía a implícita o explícita, ni implica una responsabilidad legal, se ofrece únicamente para su consulta.