



HERBICIDAS

Ficha Técnica

ANACLOR 880 (acetoclor)

Herbicida agrícola / Concentrado emulsionable

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Acetoclor: 72.70% 2-cloro-N-etoximetil-6'-etilacet-o-toluidida (Equivalente a 800 g de I.A./L a 20°C)

Ingredientes Inertes: Protectante AD-67, Surfactante, estabilizador y solvente 27.30%

Formulación: Concentrado emulsionable



MODO Y MECANISMOS DE ACCIÓN

Anaclor 880® es un cloroacetamida sistémica con actividad herbicida pre-emergente, de acción residual y selectiva en maíz, resulta eficaz en el control de malezas de hoja ancha y de hoja angosta. Presentado en forma de concentrado emulsionable con protectante AD-67.

Es absorbida por la radícula de la planta en germinación y secundariamente por las raíces. Es fuertemente absorbida por el suelo, su actividad sobre las malezas dura unas 8-12 semanas.

Cultivos | Recomendaciones de uso

Cultivo	Maleza	Dosis
Maíz	Maleza de hoja ancha Quelite (<i>Amaranthus spp.</i>)	2.0 – 2.5 L/ha
	Maleza de hoja angosta Zacate panicum (<i>Panicum spp.</i>) Zacate plumilla (<i>Leptochloa spp.</i>) Zacate pinto (<i>Echinochloa colona</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	
	Cyperaceas Coquillo (<i>Cyperus esculentus</i>).	

()= Intervalo de Seguridad, días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha; SL= Sin Límite. Tiempo de reentrada a los lugares tratados, 24 h después de realizada la aplicación. Mantenga constante la dosis indicada, los intervalos de aplicación pueden variar dependiendo de la severidad de la maleza.

REGISTRO RSCO-HEDE-0288-305-009-073

PRECAUCIÓN

Categoría Toxicológica 4

MÉTODOS PARA PREPARAR EL PRODUCTO

Rompa el sello de garantía y abra el envase girando la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj, teniendo cuidado de no salpicarse o inhalar el producto. Llene hasta la mitad el tanque del equipo de aplicación con agua limpia, agregue la dosis recomendada de **Anaclor 880®** lentamente, resbalándolo por las paredes del tanque donde se realice la mezcla para evitar salpicaduras, posteriormente complete el llenado, haciendo una pequeña agitación. Llene los recipientes del equipo de aplicación siempre a favor del viento.

INTERVALO ENTRE APLICACIONES

Aplique al inicio del cultivo en preemergencia.

MÉTODOS PARA APLICAR EL PRODUCTO

Equipo de aplicación. Se deben usar boquillas del tipo TJ de abanicoplano, números 8003, 8004 ó TK3, TK4. Para aplicación terrestre calibrar el equipo de aplicación a un volumen de agua de 200 – 300 L/ha. ANACLOR 880 puede ser aplicado con equipos manuales y de tractor.

Anaclor 880® se debe aplicar sobre suelo bien preparado sin terrones grandes y sin restos de rastrojo, es muy importante incorporar el producto de forma mecánica inmediatamente después de la aplicación a una profundidad no mayor de 5 cm, para evitar pérdida de producto por efecto de la luz solar. Se recomienda aplicar a una presión de 40 psi (libras por pulgada cuadrada) para obtener una aspersión uniforme. No se aplique ni permita que caiga en zonas ocupadas por seres humanos y animales domésticos.

TOXICOLOGÍA A LOS ANIMALES Y HUMANOS (DL₅₀, CL₅₀)

Estudio	Toxicidad
Oral agudo	1929 mg/kg
Dermal agudo	>2000 mg/kg
Inhalatorio agudo	3.99 mg/L

IMPORTANTE: La información aquí contenida no deberá tomarse como una fuente de garantía a implícita o explícita, ni implica una responsabilidad legal, se ofrece únicamente para su consulta.