



HERBICIDAS

Ficha Técnica

ANACLOR XTRA (acetoclor + atrazina)

Herbicida agrícola / Suspo-Emulsión

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Acetoclor: 46.30% 2-cloro-N-etoximetil-6'-etilacet-o-toluidida (Equivalente a 516 g de I.A./L a 20°C)

Atrazina: 18.40% 6-Cloro-N₂-etil-N₄-isopropil-1,3,5-triазina-2,4-diamina (Equivalente a 204 g de I.A./L a 20°C)

Ingredientes Inertes: Emulsificante, Dispersante, Antiespumante y Diluyente 35.30%

Formulación: Suspo-Emulsión



MODO Y MECANISMOS DE ACCIÓN

Anaclor XTRA® es un herbicida formulado como suspo-emulsión. Este herbicida es absorbido por las raíces y las hojas de la maleza en el cultivo de maíz y sorgo.

Cultivos | Recomendaciones de uso

Cultivo	Maleza	Dosis	Observaciones
Maíz Sorgo (0)	Quelite (<i>Amaranthus spp.</i>) Flor amarilla (<i>Melampodium divaricatum</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Zacate pitillo (<i>Ixophorus unisetu</i>) Hierba de pollo (<i>Commelina diffusa</i>)	2.0 – 4.0 L/ha	Realizar una aplicación en cobertura total después de la siembra y antes de la emergencia de la maleza y el cultivo; volumen de aplicación sugerido 250 -350 L de agua/ha
	Zacate cola de zorra (<i>Setaria glauca</i>)	3.0 – 4.0 L/ha	

()= Intervalo de Seguridad, días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha; SL= Sin Límite. Tiempo de reentrada a los lugares tratados, 24 h después de realizada la aplicación. Mantenga constante la dosis indicada, los intervalos de aplicación pueden variar dependiendo de la severidad de la maleza.

REGISTRO RSCO-MEZC-HEDE-0288-0204-X0106-425-64.7

PRECAUCIÓN

Categoría Toxicológica 4

MÉTODOS PARA PREPARAR EL PRODUCTO

Con el equipo de seguridad puesto antes de usar el producto, agite el envase. Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y mida el producto a utilizar con una probeta, antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una pre mezcla en un recipiente limpio por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de **ANACLOR XTRA** a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una solución uniforme. Sin dejar de agitar vierta la pre mezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogenizar la mezcla y aplicar de inmediato.

INTERVALO ENTRE APLICACIONES

Aplique al inicio del cultivo en preemergencia.

MÉTODOS PARA APlicAR EL PRODUCTO

Equipo de aplicación. Se deben usar boquillas del tipo TJ de abanicoplano, números 8003, 8004 ó TK3, TK4. Para aplicación terrestre calibrar el equipo de aplicación a un volumen de agua de 200 – 300 L/ha. ANACLOR 880 puede ser aplicado con equipos manuales y de tractor.

Anaclor 880® se debe aplicar sobre suelo bien preparado sin terrenos grandes y sin restos de rastrojo, es muy importante incorporar el producto de forma mecánica inmediatamente después de la aplicación a una profundidad no mayor de 5 cm, para evitar pérdida de producto por efecto de la luz solar. Se recomienda aplicar a una presión de 40 psi (libras por pulgada cuadrada) para obtener una aspersión uniforme. No se aplique ni permita que caiga en zonas ocupadas por seres humanos y animales domésticos.

TOXICOLOGÍA A LOS ANIMALES Y HUMANOS (DL₅₀, CL₅₀)

Estudio	Toxicidad
Oral agudo	772.79 mg/kg
Dermal agudo	3863.98 mg/kg
Inhalatorio agudo	2.31 mg/L

IMPORTANTE: La información aquí contenida no deberá tomarse como una fuente de garantía a implícita o explícita, ni implica una responsabilidad legal, se ofrece únicamente para su consulta.