



ANAJALSA

## HERBICIDAS

## Ficha Técnica

# DIURON 800 FW (Diuron)

USO AGRÍCOLA

DIURON 800 FW

HERBICIDAS

Herbicida sistémico, recomendado para usarse como pre-emergente y post-emergente en el control de gramíneas y de malezas de hoja ancha, que se aplica en forma de aspersión.

### COMPOSICIÓN PORCENTUAL

**Diuron:** 64.27% Equivalente a 800.0 g de I.A. /

**Ingredientes Inertes:** Dispersante, humectante, espesante, anticongelante, antiespumante, y diluyente 35.73%

**Formulación:** Suspensión acuosa

### ESPECTRO DE CONTROL

**Mazorquilla** (*Lupinus campestris*), **Correhuela** (*Ipomoea purpurea*), **Aceitilla blanca** (*Bidens odorata*), **Quelite o bleo** (*Amaranthus hybridus*), **Caminadora** (*Rottboellia cochinchinensis*)

### MODO Y MECANISMOS DE ACCIÓN

Es un herbicida que actúa de manera sistémica, translocándose dentro de la planta luego de ser absorbidos por las raíces junto con el agua y los minerales vía apoplasto (xilema); Su actividad foliar es de contacto, alcanzando una mayor eficiencia en aplicación con coadyuvantes y con una buena cobertura a de la aspersión.

## Cultivos

### Recomendaciones de uso

Cultivo	Plaga	Dosis	Observaciones
Frijol (SL)	<b>Mazorquilla</b> ( <i>Lupinus campestris</i> ), <b>Correhuela</b> ( <i>Ipomoea purpurea</i> ), <b>Aceitilla blanca</b> ( <i>Bidens odorata</i> ), <b>Quelite o bleo</b> ( <i>Amaranthus hybridus</i> ), <b>Caminadora</b> ( <i>Rottboellia cochinchinensis</i> )	3.0 - 3.5	Realizar una aplicación en post-emergencia al cultivo y dirigida a la maleza; volumen de aplicación 380 L/ha.

( )= Intervalo de Seguridad, días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha; SL= Sin Límite. Tiempo de reentrada a los lugares tratados, 24 h después de realizada la aplicación. Mantenga constante la dosis indicada, los intervalos de aplicación pueden variar dependiendo de la severidad de la enfermedad.

REGISTRO RSCO-HEDE-0221-X0069-008-64.27

**PRECAUCIÓN**

Categoría Toxicológica 4

## MÉTODOS PARA PREPARAR EL PRODUCTO

En un tanque agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente el producto necesario para una hectárea, agitando continuamente hasta obtener una solución uniforme. Complete con el agua necesaria, sin dejar de agitar y aplique de inmediato.

No almacene la solución de aspersión preparada.

## INTERVALO ENTRE APLICACIONES

Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha, y SL = Sin Límite.

## MÉTODOS PARA APLICAR EL PRODUCTO

Las aplicaciones deben realizarse en etapas tempranas del desarrollo de las malezas, se recomienda realizar aplicaciones con coadyuvantes en pos-emergencia de malezas.

**Diuron® 800 FW** debe ser aplicado con condiciones óptimas de humedad del suelo, con el fin de garantizar la traslocación en las malezas objetivo.

## TOXICOLOGÍA A LOS ANIMALES Y HUMANOS (DL50, CL50)

Estudio	Toxicidad
Oral agudo	3532.57 mg/kg
Dermal agudo	3889.84 mg/kg
Inhalatorio agudo	2.061 mg/L

IMPORTANTE: La información aquí contenida no deberá tomarse como una fuente de garantía a implícita o explícita, ni implica una responsabilidad legal, se ofrece únicamente para su consulta.