



ANAJALSA

## HERBICIDAS

## Ficha Técnica

# INTEMPERIE (Diuron+ Hexazinona)

USO AGRÍCOLA

# INTEMPERIE

HERBICIDAS

Es un herbicida que actúa por translocación para el control post-emergente de las malezas de hojas anchas y angostas, en el cultivo de caña de azúcar (*saccharum officinarum*).

### COMPOSICIÓN PORCENTUAL

**Diuron:** 53.30% Equivalente a 533.0 g de I.A. / Kg.

**Hexazinona:** 6.70% Equivalente a 67.0 g de I.A. / Kg

**Ingredientes Inertes:** Humectante, dispersante, humectante, estabilizante y relleno 40.00%

**Formulación:** Gránulos dispersables en agua

### ESPECTRO DE CONTROL

**Tripa de pollo** (*Commelina diffusa*), **Campanilla** (*Ipomoea purpurea*), **Verdolaga** (*Portulaca oleracea*), **Zacate Azul** (*Poa annua*), **Zacate Johnson** (*Sorghum halepense*)

### MODO Y MECANISMOS DE ACCIÓN

Es un herbicida selectivo a la caña de azúcar que actúa en forma sistémica y por contacto entra a la maleza por las hojas y raíces. Su uso es de preemergencia y post emergencia dirigida a la maleza, el cual contiene dos herbicidas selectivos diurón y hexazinona. Controla malezas de hoja ancha y zacates.

## Cultivos

## Recomendaciones de uso

Cultivo	Plaga	Dosis	Observaciones
Caña de azúcar (30)	<b>Tripa de pollo</b> ( <i>Commelina diffusa</i> ) <b>Campanilla</b> ( <i>Ipomoea purpurea</i> ) <b>Verdolaga</b> ( <i>Portulaca oleracea</i> ) <b>Zacate Azul</b> ( <i>Poa annua</i> ) <b>Zacate Johnson</b> ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0 - 4.0 Kg/Ha	Realizar una aplicación en post-emergencia a la maleza y al cultivo, volumen de aplicación 410 – 510 L agua/ha

( )= Intervalo de Seguridad, días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha; SL= Sin Límite. Tiempo de reentrada a los lugares tratados, 24 h después de realizada la aplicación. Mantenga constante la dosis indicada, los intervalos de aplicación pueden variar dependiendo de la severidad de la maleza.

REGISTRO RSCO-MEZC-1222-0668-343-60

## PRECAUCIÓN

Categoría Toxicológica 4

## MÉTODOS PARA PREPARAR EL PRODUCTO

Abra el envase de **Intemperie®** utilizando el equipo de protección personal que se describe en el apartado "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO" de esta etiqueta. Agregue la mitad de la cantidad requerida de agua al tanque, adicione la dosis completa del producto, agite y continúe la agitación mientras se agrega el resto del agua calculada en la calibración. Es importante continuar la agitación constante para mantener una solución uniforme. Calibre su equipo de aplicación. Utilice el volumen de agua necesario para lograr una buena cobertura del área a tratar.

## MÉTODOS PARA APLICAR EL PRODUCTO

Llenar el tanque de agua a 3/4 de su capacidad, mida con una probeta de plástico la cantidad de producto a usar y agregue al tanque; agite constantemente y agregue el resto de agua, Es importante continuar la agitación constante para mantener una solución uniforme. Calibre su equipo de aplicación. Utilice el volumen de agua necesario para lograr una buena cobertura del área a tratar.

## TOXICOLOGÍA A LOS ANIMALES Y HUMANOS (DL50, CL50)

Estudio	Toxicidad
Oral agudo	2000 - 5000 mg/kg
Dermal agudo	2000 - 5000 mg/kg
Inhalatorio agudo	1.0 - 5.0 mg/L

IMPORTANTE: La información aquí contenida no deberá tomarse como una fuente de garantía a implícita o explícita, ni implica una responsabilidad legal, se ofrece únicamente para su consulta.