LABOR 360
(glifosato)

Herbicida no selectivo, soluble en agua, que controla las malezas en los cultivos indicados.



COMPOSICIÓN PORCENTUAL

GLIFOSATO: 41.000%. Sal isopropanilamina de N-(fosfonometil)glicina. Equivalente a 480 g de i.a. / L a 20 °C.

Ingredientes Inertes: 59.000%. Diluyente (agua), Impurezas y Humectante.

Formulación: Solución concentrada acuosa

MODO Y MECANISMOS DE ACCIÓN

El glifosato pertenece al Grupo 9 (anteriormente Grupo G), caracterizado por la inhibición de la EPSPS. La interrupción de esta vía metabólica provoca la acumulación de shikimato-3-fosfato y el agotamiento de aminoácidos aromáticos esenciales, lo que culmina en la parálisis de la síntesis de proteínas y la muerte de la planta.

ESPECTRO CONTROL

Zacate johnson *(Sorghum halepense)*, **Correhuela** *(Convolvolus arvensis)*, **Zacate bermuda** *(Cynodon dactylon)*, **Zacate para** *(Brachiaria mustica)*, **Zacate estrella** *(Cynodon spp.)*, **Zacate guinea** *(Panicum maximum)*, **Bledo** *(Amaranthus sp.)*, **Grama del norte** *(Agropyron repens)*, **Coquillo** *(Cyperus spp.)*

Cultivos | Recomendaciones de uso

Cultivo	Malezas	Dosis
VID NOGAL (SL)	**Zacate johnson** *(Sorghum halepense)*	2 – 4 L/ha
	Correhuela *(Convolvolus arvensis)*	8 L/ha
	Zacate bermuda *(Cynodon dactylon)*	4 – 6 L/ha
AGUACATERO (SL)	**Zacate bermuda** *(Cynodon dactylon)*	4 – 6 L/ha
CÍTRICOS (SL)	**Zacate johnson** *(Sorghum halepense)*	2 – 4 L/ha
	Zacate para *(Brachiaria mustica)*	3 – 4 L/ha
	Zacate estrella *(Cynodon spp.)*	
	Zacate guinea *(Panicum maximum)*	
	Correhuela *(Convolvolus arvensis)*	8 L/ha
CAFÉ PLÁTANO (SL)	**Bledo** *(Amaranthu ssp.)*	1.5 – 3 L/ha
	Zacate johnson *(Sorghum halepense)*	2 – 4 L/ha
	Grama del norte *(Agropy ronrepens)*	2 – 6 L/ha
Pre-siembra de cultivos anuales: ALFALFA, ALCACHOFA, ACELGA, APIO, AJO, AVENA, ARROZ, BETABEL, BRÓCOLI, BERENJENA, MAÍZ, CACAHUATE, CALABAZA, CEBOLLA, CENTENO, COLIFLOR, CHICHARO, CHILE, ESPINACA, FRIJOL, LECHUGA, MELÓN, MOSTAZA, PEPINO, PAPA, PASTOS, RÁBANO, SORGO, SOYA, SANDÍA, JITOMATE, TRIGO Y ZANAHORIA. (SL)	**Zacate johnson** *(Sorghum halepense)*	2 – 4 L/ha
	Correhuela *(Convolvolus arvensis)*	4 – 8 L/ha
	Coquillo *(Cyperus spp.)*	4 – 6 L/ha

Tiempo de reentrada a campos tratados: 12 horas después de la aplicación. ( ) Intervalo de seguridad (SL): Sin Límites

REGISTRO **RSCO-HEDE-0230-331-014-041**

MÉTODOS PARA PREPARAR EL PRODUCTO

Rompa el sello de garantía y abra el envase girando la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj, teniendo cuidado de no salpicarse o inhalar el producto. Llene hasta la mitad el tanque del equipo con agua limpia, agregue la dosis recomendada de **LABOR 360** lentamente, resbalándolo por las paredes del tanque para evitar salpicaduras, posteriormente complete el llenado, haciendo una pequeña agitación. Llene los recipientes del equipo de aplicación siempre a favor del viento.

MÉTODOS PARA APLICAR EL PRODUCTO

Para tratamiento localizado, mezclar 1.25 a 2.5 L de **LABOR 360** en 100 L de agua; en aplicación total, mezclar 5 a 6 L de **LABOR 360** en 200 a 400 L de agua por hectárea. Para aplicaciones de bajo volumen, utilice boquilla "T Jeet" de abanico 8001. No se aplique ni permita que caiga en zonas ocupadas por seres humanos y animales domésticos.

PRECAUCIÓN

Categoría Toxicológica 5

CONTRAINDICACIONES:

No se aplique en horas de calor intenso, con el viento en contra, ni cuando éste sea fuerte (más de 15 km/hr).

INCOMPATIBILIDAD:

Este producto no debe mezclarse con herbicidas, excepto con Acetoclor, Atrazina, 2,4-D Amina, Oxyfluorfeno y Diurón. No se debe mezclar con productos de fuerte reacción alcalina. Solo debe mezclarse con productos registrados y autorizados en los cultivos aquí indicados.

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (DL_{50}, CL_{50})

Toxicidad	Resultado
Oral (DL_{50})	4300 mg/kg
Dermal (DL_{50})	>6000 mg/kg
Inhalación (CL_{50})	>4.98 mg/L

IMPORTANTE: La información aquí contenida no deberá tomarse como una fuente de garantía a implícita o explícita, ni implica una responsabilidad legal, se ofrece únicamente para su consulta.