



ANAJALSA

# INSECTICIDAS

# Ficha Técnica

## ANATER 5%-G (TERBUFOS)

Este producto es Insecticida y/o Acaricida agrícola / Granulado

USO AGRÍCOLA



# ANATER 5%-G

INSECTICIDAS

### COMPOSICIÓN PORCENTUAL

**Terbufos:** S-[[[1,1- Dimetiletil]tio]metil]0,0-dietil fosforoditioato (Equivalente a 50 g de I.A./kg) en peso no menos de 5.00%  
**Ingredientes Inertes:** Diluyente (Granulado) y Estabilizador en peso no menos de 95.00% TOTAL 100.00%  
**Formulación:** Granulado

### ESPECTRO DE CONTROL

**Diabrotica** (*Diabrotica spp.*)

### MODO Y MECANISMOS DE ACCIÓN

ANATER 5%-G actúa como un inhibidor de la acetilcolinestera, afectando directamente el sistema nervioso, causando parálisis y posteriormente la muerte. Producto para aplicación granular. Amplio espectro de control. Con efecto nematocida e insecticida Este producto no debe mezclarse con ningún otro plaguicida.

### INCOMPATIBILIDAD

ANATER 5%-G no se debe mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.

## Cultivos

## Recomendaciones de uso

| Cultivo                 | Plaga   | Dosis    | Época de aplicación   |
|-------------------------|---|----------|---|
| MAÍZ (60)<br>SORGO (60) | <b>Diabrotica</b><br>( <i>Diabrotica spp.</i> ) | 20 kg/ha | Una aplicación en banda al momento de la siembra. Colocar los gránulos en una banda de 18 cm sobre el surco directamente detrás de la zapata de la sembradora y delante de la rueda prensadora. |

S= Intervalo de Seguridad, días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha; SL= Sin Límite. Tiempo de reentrada a los lugares tratados, 24 h después de realizada la aplicación.

REGISTRO RSCO-INAC-0163-330-005-005

**PELIGRO**

**Categoría 2**

ANATER 5%-G es extremadamente tóxico para animales terrestres de sangre caliente (mamíferos). Este producto es extremadamente tóxico para animales (peces, invertebrados acuáticos) y altamente tóxico para plantas acuáticas (algas). ANATER 5%-G es moderadamente tóxico para abejas. No lo aplique cuando el cultivo o las malezas están en flor y cuando las abejas se encuentren libando.

## MÉTODOS PARA PREPARAR EL PRODUCTO

Abra la bolsa por la parte superior, teniendo cuidado de no derramar el producto. Llene los recipientes del equipo de aplicación siempre a favor del viento. Generalmente los gránulos son depositados en hilera al lado de la semilla o alrededor de la planta. No se aplique ni permita que caiga en zonas ocupadas por seres humanos y animales domésticos.

## INTERVALO ENTRE APLICACIONES

Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha es de 60 días.

## MÉTODOS PARA APLICAR EL PRODUCTO

ANATER 5%-G se puede aplicar con granuladora manual, acoplada al tractor.

## TOXICOLOGÍA A LOS ANIMALES Y HUMANOS (DL50, CL50)

| Estudio           | Toxicidad |
|-------------------|-----------|
| Oral agudo        | 10 mg/kg  |
| Dermal agudo      | 100 mg/kg |
| Inhalatorio agudo | 0.1 mg/L  |

IMPORTANTE: La información aquí contenida no deberá tomarse como una fuente de garantía a implícita o explícita, ni implica una responsabilidad legal, se ofrece únicamente para su consulta.