



ANAJALSA

INSECTICIDAS

Ficha Técnica

ANATRINA (permetrina)

USO AGRÍCOLA



ANATRINA

INSECTICIDAS

Este producto es un Insecticida y/o Acaricida agrícola / Concentrado emulsionable

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Permetrina: No menos de 33.66% Equivalente a 340 g de I.A./L a 20°C

Ingredientes Inertes: Solventes, Emulsificantes y Compuestos relacionados..... No más de 66.34% Total 100.00%

Formulación: Concentrado emulsionable

MODO Y MECANISMOS DE ACCIÓN

ANATRINA® es un insecticida piretroide a base de permetrina que actúa por contacto e ingestión para el control de plagas aquí indicadas, especialmente larvas de Lepidoptero.

ANATRINA® puede ser aplicado con equipos manuales y de tractor.

Cultivos

Recomendaciones de uso

Cultivo	Plaga	Dosis
Aguacatero (7)	Palomilla del hueso (<i>Stenoma catenifer</i>), Periquito del aguacate (<i>Metcalfiella monograma</i>), Mosca verde del aguacate (<i>Aethalion quadratum</i>), Barrenador grande del hueso (<i>Heilipus lauri</i>), Barrenador pequeño del hueso (<i>Conotrachellus aguacatae</i>)	200-300 ml/ 1000 L de agua
Algodonero (14)	Gusano bellotero (<i>Heliothis spp.</i>), Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>), Gusano rosado (<i>Pectinophora gossypiella</i>), Perforador de la hoja (<i>Bucculatrix thurberiella</i>), Gusano peludo (<i>Estigmene acrea</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>), Gusano de la hoja (<i>Alabama argillacea</i>),	400-600 ml/ha
Maíz, Sorgo (1)	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>), Barrenador del tallo (<i>Diatraea grandella</i>)	300-500 ml/ha
Papa (7)	Palomilla de la papa (<i>Phthorimaea operculella</i>), Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>) (<i>Pseudoplusia includens</i>),	400-600 ml/ha
Soya (6)	Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>) (<i>Pseudoplusia includens</i>), Gusano terciopelo (<i>Anticarsia gemmatalis</i>), Gusano peludo (<i>Estigmene acrea</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)	300-500 ml/ha
Jitomate, Sandía, Pepino (7)	Gusano alfiler (<i>Keiferia lycopersicella</i>), Gusano del fruto (<i>Heliothis zea</i>), Minador de la hoja (<i>Liriomyza spp.</i>), Gusano de cuerno (<i>Manduca quinquemaculata</i>)	400-600 ml/ha
Manzano, Durazno, Peral (14)	Palomilla de la manzana (<i>Laspeyresia pomonella</i>),	200-300 ml/ 100 L de agua

Cultivo	Plaga	Dosis
Col (1)	Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>)	
Coliflor (1)	Mariposa blanca de la col (<i>Pieris rapae</i>),	
Col de Bruselas (1)	Gusano del corazón de la col (<i>Copitarsia consueta</i>)	300-500 ml/ha
Apio (3)	Palomilla dorso de diamante (<i>Plutella xylostella</i>), Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)	
Lechuga (1)	Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>)	
Espinaca (7)	Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)	400-600 ml/ha
Espárrago (1)	Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)	300-500 ml/ha
Berenjena (3)	Gusano del fruto (<i>Heliothis zea</i>) Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>) Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>)	
Chile (3)	Gusano del fruto (<i>Heliothis zea</i>) Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>) Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>) Minador de la hoja (<i>Lyriomyza munda</i>)	
Brócoli (7)	Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>) Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>) Gusano del corazón de la col (<i>Copitarsia consueta</i>)	400-600 ml/ha
Pastos (10)	Salivazo o Mosca pinta (<i>Aeneolamia postica</i>) (<i>Prosapia simulans</i>)(<i>P. bicincta</i>)	
Melón Calabaza (17)	Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>) Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>)	

Período de reentrada al área tratada: 72 horas después de la aplicación. () Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. SL=Sin límite.

REGISTRO RSCO-INAC-0156-329-009-034

PRECAUCIÓN

Mortal en caso de ingestión Mortal por el contacto con la piel

MÉTODOS PARA APLICAR EL PRODUCTO

Rompa el sello de garantía y abra el envase girando la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj, teniendo cuidado de no salpicarse o inhalar el producto. Llene hasta la mitad el tanque del equipo de aplicación con agua limpia, agregue la dosis recomendada de **ANATRINA®** lentamente, resbalándolo por las paredes del tanque para evitar salpicaduras, posteriormente complete el llenado, haciendo una pequeña agitación.

TOXICOLOGÍA A LOS ANIMALES Y HUMANOS (DL50, CL50) DEL PRODUCTO FORMULADO

Estudio	Toxicidad
Oral agudo	1485.44 mg/kg
Dermal agudo	< 2000 mg/kg
Inhalatorio agudo	1.485 mg/L

IMPORTANTE: La información aquí contenida no deberá tomarse como una fuente de garantía a implícita o explícita, ni implica una responsabilidad legal, se ofrece únicamente para su consulta.

INCOMPATIBILIDAD

ANATRINA® no se debe mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.

ECOTOXICIDAD

ANATRINA® es extremadamente tóxico para animales (peces, invertebrados acuáticos) y plantas acuáticas (algas). Este producto es altamente tóxico para abejas. No lo aplique cuando el cultivo o las malezas están en flor y cuando las abejas se encuentren libando.