



ANAJALSA

INSECTICIDAS

Ficha Técnica

FLASH C (Clorpirifos etil)

USO AGRÍCOLA



FLASH C

INSECTICIDAS

Es un Insecticida y acaricida organofosforado no sistémico con actividad por contacto, ingestión e inhalación de gran efecto de choque y bajo poder residual. Presentado como polvo seco para ser aplicado con maquinaria o manual.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Clorpirifos etil: 1.5% Equivalente a 15.0 g de I.A. / kg

Ingredientes Inertes: 98.50% Diluyente, solvente y diluyente

Formulación: Polvo

ESPECTRO DE CONTROL

Gusano cogollero (*Spodoptera frugiperda*),

Mosquita midge (*Contarinia sorghicola*)

MODO Y MECANISMOS DE ACCIÓN

FLASH C es un insecticida del grupo de los organofosforados, por lo tanto actúa inhibiendo la acción de la acetilcolinesterasa mediante la combinación con esta enzima, por lo que la acetilcolina no se libera en el sitio receptor y el mensaje del impulso nervioso continua pasando entre las terminales nerviosas del insecto, esto resulta en una excesiva transmisión de impulsos nerviosos, parálisis y finalmente la muerte de los insectos.

Cultivos

Recomendaciones de uso

Cultivo	Plaga	Dosis	Época de aplicación
Maíz (21)	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	25 - 30 Kg/ha	Aplicar al follaje. Realizar una aplicación. Época de aplicación: en desarrollo vegetativo.
Sorgo (21)	Mayate rayado (<i>Colaspis spp</i>)	25 - 30 Kg/ha	Aplicación al follaje. Realizar dos aplicaciones a intervalos de 5 días. Época de aplicación: en floración y formación de panoja.

() Intervalo de Seguridad, días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha; SL= Sin Límite. Tiempo de reentrada a los lugares tratados, 24 h después de realizada la aplicación.

REGISTRO RSCO-INAC-0115-X0148-001-1.50

PELIGRO

Categoría Toxicológica 4

MÉTODOS PARA PREPARAR EL PRODUCTO

Abra la bolsa por la parte superior, teniendo cuidado de no derramar o inhalar el producto. Llené los recipientes del equipo de aplicación siempre a favor del viento.

MÉTODOS PARA APLICAR EL PRODUCTO

Flash C puede ser aplicado por medio de espolvoreadoras manuales, motorizados o por avión. Repetir la aplicación con intervalos de 5 a 7 días hasta controlar la infestación. No se aplique ni permita que caiga en zonas ocupadas por seres humanos y animales domésticos.

INTERVALO ENTRE APLICACIONES

No realizar más de 3 aplicaciones en el ciclo del cultivo.

TOXICOLOGÍA A LOS ANIMALES Y HUMANOS (DL₅₀, CL₅₀) DE CLORPIRIFOS TÉCNICO

Estudio	Toxicidad
Oral agudo	200 mg/kg
Dermal agudo	>2000 mg/kg
Inhalatorio agudo	5.5 mg/L

IMPORTANTE: La información aquí contenida no deberá tomarse como una fuente de garantía a implícita o explícita, ni implica una responsabilidad legal, se ofrece únicamente para su consulta.