



ANAJALSA

# INSECTICIDAS

# Ficha Técnica

## ULTRAVION ULV (Malathion)

Insecticida Agrícola / Líquido concentrado

USO AGRÍCOLA



# ULTRAVION ULV

## INSECTICIDAS

### COMPOSICIÓN PORCENTUAL

**Malathión:** 96.50% Equivalente a 1187 g de I.A./L a 20°C

**Ingredientes Inertes:** Impurezas 3.5%

**Formulación:** Líquido concentrado

### ESPECTRO DE CONTROL

**Picudo del algodónero** (*Anthonomus grandis*),

**Mosca de la fruta** (*Anastrepha obliqua*)

### MODO Y MECANISMOS DE ACCIÓN

**ULTRAVION® ULV** es un insecticida y acaricida organofosforado no sistémico con actividad por contacto, ingestión e inhalación y de gran efecto de choque presentado en forma de líquido concentrado y bajo poder residual. Interfiere la transmisión de los impulsos nerviosos por inhibición de la colinesterasa.

## Cultivos

## Recomendaciones de uso

Cultivo	Plaga	Dosis	Observaciones
Algodonero (SL)	<b>Picudo del algodónero</b> ( <i>Anthonomus grandis</i> )	1.0 – 1-5 L/ha	Iniciar las aplicaciones cuando aparezcan los primeros adultos ("picudos"). Si por la infestación de la plaga es necesaria una segunda aplicación, aplicar 15 días después de la primera aplicación.
Mango (2)	<b>Mosca de la fruta</b> ( <i>Anastrepha obliqua</i> )	Mezcla: a) 200 ml de Ultravion ULV + 800 ml de Proteína hidrolizada (atrayerente) Aplicar 1 L/ha en aplicación aérea, en ULV, en banda.	Aplicar la mezcla cuando empiece la maduración de los frutos (empiecen a "pintar"). Realizar 3-4 aplicaciones por ciclo cada 7 días.
		Mezcla: b) 300 ml de Ultravion ULV + 1200 ml de Proteína hidrolizada (atrayerente) Aplicar 1.5 L/ha en aplicación aérea, en ULV, en banda.	Aplicar la mezcla cuando se presenten altas infestaciones de la mosca de la fruta y cuando la mayoría de los frutos se encuentren en la etapa susceptible (etapa de maduración). Realizar 3-4 aplicaciones por ciclo cada 7 días.

Periodo de reentrada al área tratada: 24 horas después de la aplicación.

(2) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre a última aplicación y la cosecha. SL=Sin límite.

### MÉTODOS PARA APLICAR EL PRODUCTO

Rompa el sello de garantía y abra el envase girando la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj, teniendo cuidado de no salpicarse o inhalar el producto. Vacíe **ULTRAVION® ULV** en el depósito del equipo de aplicación que debe ser de Ultra Bajo Volumen. Llene los recipientes del equipo de aplicación siempre a favor del viento. Aplique directamente al cultivo, asperjando y cubriendo el follaje perfectamente.

### ECOTOXICIDAD

**ULTRAVION® ULV** es **extremadamente** tóxico para animales (peces, invertebrados acuáticos) y plantas acuáticas (algas y plantas vasculares). Este producto es **altamente** tóxico para abejas. No lo aplique cuando el cultivo o las malezas están en flor y cuando las abejas se encuentren libando.

### INCOMPATIBILIDAD

**ULTRAVION® ULV** se aplica solo con equipo de Ultra Bajo Volumen (ULV), por lo anterior, no debe mezclarse con ningún otro producto.

IMPORTANTE: La información aquí contenida no deberá tomarse como una fuente de garantía a implícita o explícita, ni implica una responsabilidad legal, se ofrece únicamente para su consulta.